

Số /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 06 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ trung bình: 29⁰C, Cao nhất: 35⁰C, Thấp nhất: 25⁰C.
Độ ẩm trung bình: 71%, Cao nhất: 94%, Thấp nhất: 51%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/ diện tích kế hoạch (ha)
* Vụ Xuân		
- Cây ngô	Chín thu hoạch.	594,74/600 KH
- Khoai lang	Thu hoạch.	40,30/51 KH
- Cây rau	Thu hoạch.	161,22/240 KH
- Cây đậu đỗ	Thu hoạch.	19,40/18 KH
- Cây dong riềng	Phát triển thân lá, củ.	69,47/80 KH
- Đậu tương	Thu hoạch.	17,33/15 KH
- Cây lạc	Thu hoạch.	24,50/25 KH
- Cam quýt	Phát triển quả.	1.850 KH
* Vụ Mùa		
- Cây lúa	Trà sớm: Đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. Trà chính vụ: Mạ - hồi xanh.	1.730 KH
- Cây ngô	Mới trồng	473 KH

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

1. Lúa Mùa:

Ốc bươu vàng gây hại đến mức nghiêm trọng trên những diện tích lúa mới cấy - đẻ nhánh; mật độ phổ biến 2 - 3 con/m², cá biệt 25 con/m²; diện tích nhiễm 25 ha, phân bố rải rác ở các xã, thị trấn.

Các loại sâu bệnh khác gây hại nhẹ.

2. Cây cam, quýt: Sâu đục thân (*cành*), nhện, rệp, bệnh muội đen gây hại nhẹ.

3. Cây hồi: Bệnh thán thư gây hại tại xã Vũ Muộn.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa

*** Biện pháp canh tác:**

- Giữ đủ ẩm cho ruộng mạ, cấy khi mạ đạt 2 - 3 lá.
- Bón phân lót trước khi cấy. Lượng phân bón tính cho 1.000 m²:
 - + Phân chuồng hoai mục: 800 - 1.000 kg.
 - + Phân lân: 40 - 50 kg.
 - + Vôi bột (*nếu đất chua*): 40 - 50 kg.
- Bón thúc lần 1 (*thúc đẻ nhánh*) khi cây lúa bén rễ - hồi xanh (*sau cấy 5 - 7 ngày*), kết hợp sục bùn để đảm bảo cho lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung; lượng phân bón tính cho 1.000 m²:

+ Lúa thuần: Bón 12 - 14 kg đạm urê + 4 - 5 kg Kali clorua.

+ Lúa lai: Bón 16 - 20 kg đạm urê + 5 - 6 kg Kali clorua.

- Điều tiết nước: Giữ mực nước trên mặt ruộng khoảng 2 - 3 cm từ khi cấy đến sau khi bón thúc đẻ nhánh 5 - 7 ngày; sau đó rút cạn nước, chỉ để ruộng vừa đủ ẩm, khô nẻ chân chim trong suốt thời kỳ cây lúa đẻ nhánh đến khi lúa phân hóa đòng (*đứng cái*) nhằm kích thích rễ lúa mọc dài, lan rộng và cắm sâu vào đất, tăng khả năng hút nước và dinh dưỡng, tăng khả năng chống đổ.

*** Dự báo:** Chú ý phòng trừ ốc bươu vàng, bọ rầy, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bệnh nghệt rễ gây hại.

*** Biện pháp phòng trừ:**

- Ốc bươu vàng: Làm lưới chắn khi cho nước vào ruộng, vét rãnh trong ruộng để ốc tập trung vào trong rãnh và nhặt ốc đem tiêu hủy; với diện tích có mật độ ốc cao tiến hành phun bằng một trong các loại thuốc sau: HN-Samole 700WP, Diator 830WDG...

- Sâu đục thân: Ngắt ổ trứng, nhổ danh héo đem tiêu hủy. Sử dụng một trong các loại thuốc như: Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC,... để phun phòng trừ khi sâu non mới nở (*phun thuốc cho mạ trước khi cấy từ 3 - 5 ngày*).

- Bệnh đạo ôn: Khi mạ bị bệnh phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Fuji-one 40EC, Filia 525EC, Kasai 21,2WP,...

- Bệnh nghệt rễ: Diện tích bị bệnh cần tiến hành sục bùn để giải phóng bớt khí độc trong đất, nhất là vùng rễ cây lúa; sau đó tháo kiệt nước phơi ruộng nứt nẻ chân chim, kết hợp bón vôi bột 40 - 50 kg/1.000 m². Sau khi xử lý từ 3 - 5 ngày, kiểm tra nếu thấy cây lúa ra rễ trắng và ra thêm lá mới thì sử dụng các loại phân bón qua lá để phun, giúp cây lúa nhanh hồi phục.

2. Cây cam quýt:

Chú ý phòng trừ sâu đục thân, sâu đục cành, nhện, rệp, bệnh muội đen, bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rữa,...

3. Cây hồi:

- Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại.

- Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư: Vệ sinh rừng hồi đang bị bệnh gây hại, tiêu hủy những cành lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng.

Phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Revus Opti 440SC, Cabrio Top 600WG, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... bệnh hại nặng tiến hành phun lặp lại từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Đối với diện tích cây hồi tuổi nhỏ: Chủ động sử dụng các loại máy phun thuốc trừ sâu đeo vai để phun phòng, trừ ngay khi phát hiện có vết bệnh gây hại.

+ Những diện tích rừng hồi lâu năm, cây cao: Sử dụng các loại máy phun động cơ hoặc máy phun thuốc trừ sâu dạng khói để phun phòng, trừ bệnh.

Chú ý: Không phun thuốc hóa học ở những diện tích hồi đầu nguồn nước, gần khu dân cư. Phun thuốc theo “kỹ thuật 4 đúng”.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp đôn đốc bà con nông dân làm đất, gieo trồng đảm bảo thời vụ, đồng thời hướng dẫn người dân chăm sóc và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại trên cây trồng (*chú ý ốc brou vàng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bệnh nghệt rễ gây hại trên cây lúa*).

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Trung tâm VHTT&Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Bản giấy:

- Lưu: TTDVNN.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụy

