

Số: /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 16 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 27⁰C, Cao nhất: 30⁰C, Thấp nhất: 24⁰C.
Độ ẩm trung bình: 84%, Cao nhất: 99%, Thấp nhất: 69%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/điện tích kế hoạch (ha)
- Ngô Xuân	Thu hoạch xong	594,74/600 KH
- Ngô Mùa	3-5 lá	473
- Lúa Mùa sớm	KSK-làm đòng	1.730 KH
- Lúa Mùa chính vụ	Đẻ nhánh rộ-kết thúc đẻ nhánh	
- Cam quýt	Phát triển quả	1.850 KH
- Dong riềng	Phát triển thân lá, củ	69,47/80 KH

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

1. Lúa mùa sớm:

- Bệnh đạo ôn lá: Tỷ lệ bệnh phổ biến 1%, cao 5%, cá biệt 20%. Diện tích nhiễm 0,2ha. Tại thôn Khau Cườm xã Sỹ Bình.

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại nhẹ rải rác.

2. Lúa mùa chính vụ:

- Rầy nâu+RLT, ruồi đục nõn, bệnh đạo ôn lá,... xuất hiện và gây hại nhẹ.

3. Cây ngô: Sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, Bệnh đỏ huyết dụ,...gây hại nhẹ, rải rác.

4. Cây cam, quýt: Sâu đục thân (*cành*), nhện, rệp gây hại nhẹ.

5. Cây hời: Bệnh thán thư gây hại tại xã Vũ Muộn.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa mùa sớm:

* **Biện pháp canh tác:**

- Bón đón đòng (Khi cây lúa có khối sơ khởi) và giữ mực nước trong ruộng từ 2 - 3 cm đến khi lúa chín đỏ đuôi thì tháo cạn. Lượng phân tính cho 1.000 m².

- + Đối với lúa thuần: bón 6 - 8 kg phân Đạm urê + 10 - 11 kg phân Kaliclorua.
- + Đối với lúa lai: bón 7 - 9 kg phân Đạm urê + 12 - 13 kg phân Kaliclorua.
- Chú ý: Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá,...

*** Biện pháp phòng trừ :**

- Bệnh đạo ôn lá: Những ruộng lúa đang bị bệnh cần giữ nước trong ruộng 3 - 4 cm, dùng bón phân đạm, chất kích thích sinh trưởng hay phân bón lá chứa đạm. Phun trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc như: Folia® 525SE, Trizole 400SC/75WG, Fuji-One 40EC,... Ruộng bị bệnh hại nặng phải phun 2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày.

Chú ý: Tiến hành phun vào buổi chiều mát, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá, bông. Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt. Những ruộng phun xong gặp mưa cần phải phun lại.

2. Cây lúa mùa chính vụ:

*** Biện pháp canh tác:**

- Chuẩn bị phân bón đón đòng với những diện tích cấy sớm, những giống ngắn ngày.

- Điều tiết nước: Giữ mực nước trên mặt ruộng khoảng 2 - 3 cm từ 5 - 7 ngày; sau đó rút cạn nước, chỉ để ruộng vừa đủ ẩm, khô nẻ chân chim, cứ lặp lại như vậy mục đích nhằm kích thích rễ lúa mọc dài, lan rộng và cắm sâu vào đất, làm tăng khả năng chống đổ, khả năng hút nước và dinh dưỡng.

- Làm cỏ, sục bùn để phát triển rễ mới kết hợp phát xung quanh bờ nhằm hạn chế nơi trú ngụ của SVGH và các mầm bệnh.

*** Dự báo:** Chú ý phòng trừ khi xuất hiện rầy nâu +RLT, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bệnh vàng lá vi khuẩn gây hại.

*** Biện pháp phòng trừ:**

- Rầy nâu+RLT: Khi thấy mật độ khoảng 20con/m² thì mới tiến hành phun và sử dụng các loại thuốc sau: Sạch rầy, Sen vàng, Tre bon 10 EC, gà nòi 95SP,... phun theo hướng dẫn sử dụng

- Sâu đục thân: Ngắt ổ trứng, nhổ đánh héo đem tiêu hủy. Sử dụng một trong các loại thuốc như: Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC,... để phun phòng trừ khi sâu non mới nở.

- Bệnh đạo ôn: Khi cây lúa mới xuất hiện thì tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Fuji-one 40EC, Folia 525EC, Kasai 21,2WP,...

3. Cây ngô:

*** Biện pháp canh tác:**

- Xới phá váng làm cỏ, vun gốc kết hợp bón phân thúc lần 1 lượng phân bón tính cho 1.000 m²:

+ Phân đạm urê: 8 - 10 kg; Phân kali clorua: 4 - 6 kg.

* Chú ý phòng trừ sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh đốm huyết dụ...

*** Biện pháp phòng trừ:**

- Sâu xám: Bắt thủ công bằng tay, dùng bả bẫy bướm, hoặc dùng thuốc hóa học có tính lưu dẫn như: Shecpain 36E, Gottoc 250EC, Regent 800WG, Gà nòi 95SP,... để phun.

- Sâu keo mùa thu: Có thể sử dụng thuốc Fortenza Duo 480FS để xử lý hạt giống trước khi gieo. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG, Karuba WP, Bitadin WP,... để phun trừ, phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá, nõn lá và nách lá.

- Bệnh đốm lá: Ngắt bỏ lá già, lá bị bệnh tạo thông thoáng ruộng ngô...khi bệnh nặng dùng thuốc BenZeb, Zineb, Benlate...để phun theo hướng dẫn sử dụng.

* **Dự báo:** Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh đỏ huyết dự tiếp tục gây hại nhẹ.

4. Cây cam quýt:

Chú ý phòng trừ sâu đục thân, sâu đục cành, nhện, rệp, bệnh muội đen, bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ,...

5. Cây hồi:

- Chú ý phòng trừ bệnh thán thư, sâu đo,... gây hại.

- Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư: Vệ sinh rừng hồi đang bị bệnh gây hại, tiêu hủy những cành lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng.

Phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Revus Opti 440SC, Cabrio Top 600WG, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... tiến hành phun lặp lại từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Đối với diện tích cây hồi tuổi nhỏ: Sử dụng các loại máy phun thuốc trừ sâu đeo vai để phun phòng, trừ ngay khi phát hiện có vết bệnh gây hại.

+ Những diện tích rừng hồi lâu năm, cây cao: Sử dụng các loại máy phun động cơ hoặc máy phun thuốc trừ sâu dạng khói để phun phòng, trừ bệnh.

Chú ý: Không phun thuốc hóa học ở những diện tích hồi đầu nguồn nước, gần khu dân cư.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp, cán bộ phụ trách địa bàn đơn đốc bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm sâu bệnh hại và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Trung tâm VHTT&Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Bản giấy:

- Lưu: TTDVNN.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụy

