

Số: /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 30 tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

**Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng**  
(Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022)

### I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

#### 1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 27<sup>0</sup>C, Cao nhất: 31<sup>0</sup>C, Thấp nhất: 23<sup>0</sup>C.

Độ ẩm trung bình: 80,5%, Cao nhất: 95%, Thấp nhất: 63%.

#### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/diện tích kế hoạch (ha)
- Lúa Mùa sớm	Trỗ bông - phơi màu	1.730
- Lúa Mùa chính vụ	KSK - Làm đòng	
- Ngô Mùa	7-9 lá	473
- Dong riêng	Phát triển thân lá, củ	69,47
- Cam quýt	Phát triển quả	1.850

### II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

#### 1. Lúa mùa sớm:

- Rầy nâu + rầy lưng trắng: Mật độ phổ biến 500 con/m<sup>2</sup>, cao 1.000 con/m<sup>2</sup>, cá biệt 3.000 con/m<sup>2</sup>. Diện tích nhiễm 1 ha tại thôn Phiêng Bùng xã Sỹ Bình, (Nhiễm trên những diện tích cũ, không có diện tích nhiễm mới, mật độ rầy giảm so với kỳ trước).

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ xít gây hại nhẹ rải rác.

#### 2. Lúa mùa chính vụ:

- Rầy nâu + rầy lưng trắng, sâu đục thân bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá,... xuất hiện và gây hại nhẹ.

3. Cây ngô: Sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, Bệnh thối thân, bệnh khô vằn,... gây hại nhẹ, rải rác.

4. Cây cam, quýt: Sâu đục thân (cành), nhện, rệp gây hại nhẹ.

5. Cây hòi: Bệnh thán thư gây hại tại xã Vũ Muộn.

### III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI

#### 1. Cây lúa mùa sớm:

##### \* **Biện pháp canh tác:**

- Giữ mực nước trong ruộng từ 2 - 3 cm đến khi lúa chín đỏ đuôi thì tháo cạn nước thuận tiện cho việc gặt hái.

- Chú ý: Phòng trừ rầy nâu+rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ xít,...

##### \* **Biện pháp phòng trừ :**

- Rầy nâu+rầy lưng trắng: Khi thấy mật độ lớn khoảng 20 con/m<sup>2</sup> thì sử dụng các loại thuốc sau: Sạch rầy, tre bon 10 EC, gà nòi 95SP,... phun theo hướng dẫn sử dụng.

- Sâu đục thân: Theo dõi trưởng thành (Bướm), sau khi thấy trưởng thành ra rộ từ 5-7 ngày thì ngắt bỏ ổ trứng, và sử dụng một trong các loại thuốc như: Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC,... để phun phòng trừ khi sâu non mới nở.

#### 2. Cây lúa mùa chính vụ:

##### \* **Biện pháp canh tác:**

- Tiến hành bón đón đòng và giữ mực nước trong ruộng từ 2 - 3 cm đến khi lúa chín đỏ đuôi thì tháo cạn. Lượng phân tính cho 1.000 m<sup>2</sup>.

+ Đối với lúa thuần: bón 6 - 8 kg phân Đạm urê + 10 - 11 kg phân Kaliclorua.

+ Đối với lúa lai: bón 7 - 9 kg phân Đạm urê + 12 - 13 kg phân Kaliclorua.

\* **Dự báo:** Chú ý phòng trừ khi xuất hiện rầy nâu +RLT, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bệnh vàng lá vi khuẩn gây hại.

##### \* **Biện pháp phòng trừ:**

- Rầy nâu + rầy lưng trắng: Khi thấy mật độ khoảng 20con/m<sup>2</sup> thì mới tiến hành phun và sử dụng các loại thuốc sau: Sạch rầy, Sen vàng, Tre bon 10 EC, gà nòi 95SP,... phun theo hướng dẫn sử dụng

- Sâu đục thân: Theo dõi trưởng thành (Bướm), sau khi thấy trưởng thành ra rộ từ 5-7 ngày thì ngắt bỏ ổ trứng, nhổ đánh mạ héo và sử dụng một trong các loại thuốc như: Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC,... để phun phòng trừ khi sâu non mới nở.

- Bệnh đạo ôn: Khi cây lúa mới xuất hiện thì tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Fuji-one 40EC, Filia 525EC, Kasai,...

**Chú ý:** Đối với các xã thực hiện mô hình sử dụng giống lúa chất lượng (*Giống lúa nếp địa phương: Khẩu nua Pì Pét, Khẩu nua lương*), sản xuất theo hướng hữu cơ, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ Mùa năm 2022 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. Cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện và phòng trừ bệnh đạo ôn kịp thời.

### 3. Cây ngô:

#### \* **Biện pháp canh tác:**

- Xới phá váng làm cỏ, vun gốc kết hợp bón phân thúc lần 1. Lượng phân bón tính cho 1.000 m<sup>2</sup>: Phân đạm urê: 8 - 10 kg; Phân kali clorua: 4 - 6 kg.

\* Chú ý phòng trừ sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh đỏ huyết dụ,...

#### \* **Biện pháp phòng trừ:**

- Sâu keo mùa thu: Có thể sử dụng thuốc Fortenza Duo 480FS để xử lý hạt giống trước khi gieo. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG, Karuba WP, Bitadin WP,... để phun trừ, phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá, nõn lá và nách lá.

- Bệnh đốm lá: Ngắt bỏ lá già, lá bị bệnh tạo thông thoáng ruộng ngô...khi bệnh nặng dùng thuốc BenZeb, Zineb, Benlate...để phun theo hướng dẫn sử dụng.

\* **Dự báo:** Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh lùn xoắn lá,... tiếp tục gây hại nhẹ.

### 4. Cây cam quýt:

Chú ý phòng trừ sâu đục thân, sâu đục cành, nhện, rệp, bệnh muội đen, bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ,...

### 5. Cây hồi:

- Chú ý phòng trừ bệnh thán thư, sâu đo,... gây hại.

- Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư: Vệ sinh rừng hồi đang bị bệnh gây hại, tiêu hủy những cành lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng.

Phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Revus Opti 440SC, Cabrio Top 600WG, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... tiến hành phun lặp lại từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

+ Đối với diện tích cây hồi tuổi nhỏ và những diện tích mới trồng, tiến hành phát cỏ xung quanh gốc, dây leo chú ý giữ ẩm cho cây.

## IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp, cán bộ phụ trách địa bàn đơn đốc bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm sâu bệnh hại và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời.

#### **Nơi nhận:**

##### *Bản điện tử:*

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Trung tâm VHHTT&Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

##### *Bản giấy:*

- Lưu văn thư

**GIÁM ĐỐC**

**Lăng Văn Thụy**

