

Số /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 06 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12 năm 2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ trung bình: 17⁰C, Cao nhất: 24⁰C, Thấp nhất: 10⁰C.

Độ ẩm trung bình: 68,5 %, Cao nhất: 97%, Thấp nhất: 40%.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/ diện tích kế hoạch (ha)
- Dong riềng	Đang thu hoạch	69,47
- Cam	Chín	230
- Quýt	Chín - Thu hoạch	1.172
Các cây trồng vụ đông		
- Cây khoai tây	Phát triển thân lá-hình thành tia củ	
- Cây rau các loại	Mới trồng - phát triển thân lá - thu hoạch	200,03 ha/200 ha KH
- Cây đậu đỗ các loại	Mới trồng - phát triển thân lá-thu hoạch	13/12 ha KH

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

1. Cây trồng vụ đông

- Cây rau các loại: sâu xanh, sâu tơ, rệp,... gây hại nhẹ rải rác.

- Các cây trồng khác đang giai đoạn mới trồng - phát triển thân lá, sâu bệnh gây hại nhẹ rải rác.

- Cây khoai tây: Bệnh thối rễ tỷ lệ cá biệt khoảng 2%, hại rải rác tại xã Sỹ Bình.

- Bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh mốc sương, bệnh xoắn lá,... gây hại nhẹ.

2. Cây cam, quýt: Sâu đục thân (*cành*), ngài chích hút quả, ruồi đục quả gây hại nhẹ.

3. Cây hồi: Bệnh thán thư gây hại nhẹ, rải rác tại xã Vũ Muộn.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BTVT TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây dong riềng: Khẩn trương thu hoạch cho kịp thời vụ.

2. Cây cam quýt: Chú ý phòng trừ ngài chích quả, ruồi đục quả, nhện, bọ xít, bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ,...

3. Cây hời: Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại.

- Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư: Vệ sinh rừng hời đang bị bệnh gây hại, tiêu hủy những cành, lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng. Phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Revus Opti 440SC, Cabrio Top 600WG, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Score 250EC,... Phun phòng, trừ bệnh ngay khi phát hiện có vết bệnh, bệnh hại nặng phải phun lặp lại từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

4. Cây trồng vụ đông

- Cây rau, đậu đỗ các loại: Chú ý phòng trừ bệnh sâu xanh, sâu tơ, rệp, héo xanh vi khuẩn,...

- Cây khoai tây: Chú ý phòng trừ bệnh héo xanh, bệnh mốc sương, bệnh xoắn lá,...

+ Biện pháp phòng trừ bệnh thối rễ: Trồng luân canh, lên luống cao để thoát nước, không trồng củ mang mầm bệnh, củ bị xây sát, bón phân cân đối, khi phát hiện cây bị bệnh thì tiến hành nhổ bỏ đem tiêu hủy hoặc phun thuốc AnVin, Ridomin gold...

+ Biện pháp phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn: Trồng luân canh, lên luống cao để thoát nước, không trồng củ bị xây sát, bón phân cân đối, khi phát hiện cây bị bệnh thì tiến hành nhổ bỏ đem tiêu hủy. Bệnh nặng thì phun bằng thuốc Trichoderma,...

+ Biện pháp phòng trừ bệnh mốc sương: Trồng luân canh, lên luống cao để thoát nước, không trồng củ bị xây sát, củ mang mầm bệnh, bón phân cân đối,... có thể dùng dung dịch boocdo 1% để phun phòng bệnh. Bệnh nặng thì phun bằng Ridomin, Anvin,...

+ Biện pháp phòng trừ bệnh xoắn lá: Như phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn và phun trừ các đối tượng môi giới truyền bệnh như rệp, nhện, bọ phấn,...

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp, cán bộ phụ trách địa bàn hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc các loại cây trồng vụ đông. Đôn đốc bà con nông dân thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm sâu bệnh hại và phun trừ kịp thời không để lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến năng suất./.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Trung tâm VHTT & Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Bản giấy:

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụy

