

Số /BC-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO

**Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng**  
(Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2023)

### I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

#### 1. Thời tiết

Nhiệt độ trung bình: 24,5°C, Cao nhất: 30°C, Thấp nhất: 19°C.

Độ ẩm trung bình: 77%, Cao nhất: 91%, Thấp nhất: 63%.

#### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng/Diện tích kế hoạch (ha)
<b>* Vụ xuân</b>		
- Cây lúa	Đẻ nhánh rộ	1.187 ha KH
- Cây ngô	5 - 7 lá	626 ha KH
- Cây thuốc lá	Phát triển thân lá	101,65/95 ha, đạt 107% KH
- Cây đậu tương	Gieo trồng - cây con	15 ha KH
- Cây lạc	Gieo trồng - cây con	25 ha KH
<b>* Cây trồng khác</b>		
- Cây dong riềng	Cây con	70 ha KH
- Cây cam	Giai đoạn hoa - quả nhỏ	403,45/340 ha, đạt 118,66% KH
- Cây quýt	Giai đoạn hoa - quả nhỏ	1.271,24/1.270 ha, đạt 100,10% KH

### II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG KỲ

#### 1. Cây lúa:

Bọ trĩ, ruồi đục nõn, bệnh nghẹt rễ gây hại nhẹ rải rác tại các xã, thị trấn.

#### 2. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại nhẹ rải rác tại các xã, thị trấn mật độ cá biệt 1 con/m<sup>2</sup>. Bà con đã tiến hành phun trừ.

#### 3. Cây thuốc lá:

Bệnh đốm lá, bệnh đốm mắt cua, bệnh khảm lá, rệp,... gây hại nhẹ. Bà con đã phun trừ.

**4. Cây cam, quýt:**

Sâu đục thân (*cành*), bệnh phấn trắng, sâu nhót,... gây hại nhẹ.

**5. Cây hồi:**

Bệnh thán thư gây hại nhẹ, rải rác tại xã Vũ Muộn.

**III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TRONG THỜI GIAN TỚI****1. Cây lúa vụ xuân:****\* Biện pháp canh tác:**

- Tiếp tục làm cỏ, sục bùn để đảm bảo cho lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung.
- Sau khi bón phân thúc đẻ nhánh 7 - 10 ngày thì rút nước để ruộng “nứt nẻ chân chim” lặp lại 2 - 3 lần để cho rễ lúa mọc dài, tỏa rộng và bám sâu tầng khả năng hút dinh dưỡng.

**\* Dự báo:**

Bệnh đạo ôn lá, bệnh nghệt rễ, bọ trĩ, ruồi, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại.

**\* Biện pháp phòng bệnh nghệt rễ:** Tại các diện tích bị bệnh cần khẩn trương sục bùn để giải phóng bớt khí độc trong đất, nhất là vùng rễ cây lúa; sau đó tháo kiệt nước phơi ruộng đến nứt nẻ chân chim, kết hợp bón vôi bột 40 - 50 kg/1.000 m<sup>2</sup>. Tuyệt đối không bón phân đạm trong thời kỳ này. Sau khi xử lý từ 3 - 5 ngày, tiến hành kiểm tra nếu thấy cây lúa ra rễ trắng mới và ra thêm lá mới thì bà con có thể sử dụng các loại phân bón qua lá để phun, giúp cây lúa nhanh hồi phục.

**2. Cây ngô:****\* Biện pháp canh tác:**

- Tiếp tục gieo trồng diện tích còn lại.
- Tiếp tục bón phân thúc lần 1 kết hợp xới phá váng, làm cỏ, vun gốc.

**\* Dự báo:** Sâu keo mùa thu, bệnh đốm huyết dụ, bệnh bạch tạng,...

**\* Biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu:** Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG, Karuba WP, Bitadin WP,... để phun trừ, phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá và nách lá.

**3. Cây cam quýt:**

- Chú ý phòng bệnh phấn trắng gây hại.
- Biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng: Khi thấy bệnh xuất hiện phun một trong các loại thuốc sau: Anvil 5SC, Lưu huỳnh vôi, Tilt Super 300EC,... phun 1 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 - 10 ngày.

**4. Cây dong riềng:**

Tiếp tục bón thúc để cây ra nhiều nhánh, kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ.

**5. Cây hò:**

Chú ý phòng trừ bệnh thán thư gây hại.

**6. Cây thuốc lá:**

Chú ý phòng trừ rệp, bệnh đốm mắt cua, bệnh gỉ sắt, bệnh khảm lá... gây hại.

**IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt quy trình, kỹ thuật, chăm sóc các loại cây trồng; đôn đốc bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả./.

**Nơi nhận:****Bản điện tử:**

- Chi cục TT, BVTV & QLCL tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Trung tâm VHHT & Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

**Bản giấy:**

- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC****Lăng Văn Thụy**

